

العنقودية الذهبية المقاومة ("MRSA أسئلة متكررة عن " للميثيسيلين)

يمكن أن يُطلب من الزوار

• أيضاً ارتداء رداء وقفازات.

عند مغادرة الغرفة، يزرع العاملون في المستشفى

والزوار أريديتهم وقفازاتهم وينظفون أيديهم.

يُطلب من المرضى الخاضعين لاحتياطات الملامسة أن

يظلوا في غرفهم قدر الإمكان. ينبغي ألا يخرجوا إلى المناطق المشتركة، مثل

متجر الهدايا أو المقصف. ويمكنهم الذهاب إلى مناطق أخرى في المستشفى

لأغراض العلاج أو الفحوصات.

يمكن فحص بعض المرضى لمعرفة ما إذا كانوا يحملون

على جلدهم. يتضمن هذا الفحص فرك مساحة قطنية داخل أنف المريض MRSA

• أو على جلده.

العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين)؟ MRSA ما هي

staff-ill-oh-KOK-us AW- (ينطق اسمها باللغة الإنجليزية على النحو التالي

هي جرثومة شائعة جداً يحملها 1 من بين كل 3 أشخاص على جلدهم أو في "Staph، أو (e-us

أنوفهم. لا تسبب هذه الجرثومة أية مشكلات عند معظم الناس الذين يحملونها على جلدهم. ولكن يم

أن تسبب أحياناً التهابات حادة مثل إنتان الجلد أو الجروح أو الإنتان الرئوي أو الإنتانات التهابات

الدموية.

يتم إعطاء مضادات حيوية لقتل جراثيم العنقودية الذهبية عندما تسبب الإنتانات. وتكون بعض

جراثيم العنقودية الذهبية قادرة على المقاومة بحيث لا يمكن قتلها ببعض المضادات الحيوية.

هي نوع من العنقودية الذهبية المقاومة لبعض "MRSA" العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين" أو

المضادات الحيوية التي يكثر استخدامها لعلاج إنتانات العنقودية الذهبية.

MRSA من هو الأكثر عرضة للإصابة بإنتان

في المستشفيات، يكون الأكثر عرضة للإصابة بإنتانات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين

الأشخاص الذين:

الذين يعانون من حالات صحية أخرى تجعلهم مرضى

المقيمين في المستشفى أو منزل رعاية للمسنين

. الذين تم علاجهم بالمضادات الحيوية

يمكن للأشخاص الأصحاء أو الذين لم يدخلوا إلى المستشفى أو إلى دار رعاية للمسنين أن يصابوا

بإنتانات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين أيضاً. وتظهر هذه الإنتانات في العادة على الجلد.

هناك المزيد من المعلومات عن هذا النوع من إنتانات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين،

المعروف باسم "إنتان العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين المكتسب في المجتمع"، على الموقع

<http://www.cdc.gov/mrsa> (CDC الإلكتروني لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها)

MRSA كيف يمكن أن أصاب بإنتان

على جلدهم أو من هم مصابون بالعنقودية الذهبية المقاومة MRSA إن من يحملون جراثيم

للميثيسيلين قد ينقلون هذه الجراثيم إلى الآخرين. يمكن انتقال العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين

إلى ملابسات السرير أو حواجز السرير أو أثاث الحمام أو المعدات الطبية. ويمكن انتقالها إلى

الآخرين بواسطة المعدات الملوثة وبواسطة أيدي الأطباء والممرضين وغيرهم من مقدمي الرعاية

الصحية وزوار المستشفيات.

MRSA هل يمكن علاج إنتان

وقد يحتاج بعض المرضى الذين AMRS. نعم، هناك مضادات حيوية يمكن أن تقتل جراثيم

إلى الجراحة للتخلص من الإنتان. سيحدد مقدم MRSA يعانون من خراج نتيجة الإصابة بإنتان

الصحية الوسيلة الأمثل لعلاجك. رعايتك

MRSA ما هي الإجراءات التي تتبعها المستشفيات للوقاية من إنتان

للوقاية من الإصابة بإنتان العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، يتبع الأطباء

والممرضون ومقدمو الرعاية الصحية الآخرون الإجراءات التالية:

• تنظيف أيديهم بالماء والصابون أو غسول يدين كحولي قبل العناية بكل مريض وبعدها.

• تنظيف غرف المستشفيات والمعدات الطبية بحرص.

• مخري احتياطات الملامسة عند العناية بالمرضى المصابين بالعنقودية الذهبية المقاومة

للميثيسيلين. ويعني توخي الحذر أثناء الملامسة ما يلي: إذا كان ذلك ممكناً، يستخدم المرضى

لمصابون بإنتان MRSA غرفة مفردة أو يشتركون في غرفة مع شخص آخر مصاب بإنتان MRSA.

• يرتدي مقدمو الرعاية الصحية قفازات ورداء فوق ملابسهم عند

MRSA العناية بالمرضى المصابين بإنتان

إذا لم تر من يعتنون بك ينظفون أيديهم، نرجو أن تطلب منهم ذلك.

MRSA ما الذي يمكنني فعله للمساعدة في الوقاية من إنتان

في المستشفى

تأكد من أن جميع الأطباء والممرضات الذين يعتنون بك يغسلون أيديهم بالماء ده.

عند ذهابك إلى المنزل

إذا كنت مصاباً بجروح أو لديك جهاز عابر الأوعية (مثل

القسطرة أو منفذ للتسيل الكروي) احرص على معرفة كيفية العناية بها.

عندما يزورونني؟ MRSA هل يمكن أن يلتقط أصدقائي وأفراد أسرتي

إن احتمال الإصابة بالعنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين عند زيارة شخص مصاب

بالعنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين ضئيل للغاية. لتخفيض احتمال الإصابة بالعنقودية

الذهبية المقاومة للميثيسيلين يجب على أفراد أسرتك وأصدقائك أن يقوموا بما يلي:

• تنظيف أيديهم قبل دخول غرفتك وبعد الخروج منه.

• سؤال الممرضة عما إذا كان عليهم ارتداء قفازات وأريدي وافية عند زيارتك

ما الذي ينبغي أن أفعله عندما أعود إلى المنزل بعد خروجي من المستشفى؟

إلى الآخرين يجب MRSA أو لمنع انتقال MRSA لمنع حدوث إصابة أخرى بإنتان

اتباع ما يلي:

الاستمرار في تناول أية مضادات حيوية وصفها لك

• الطبيب. لا تتناول نصف جرة أو تتوقف قبل إتمام كمية العلاج الموصوفة لك.

• نظف يديك بكثرة، خاصة قبل تغيير ضماد جرحك وبعده.

• يجب على من يعيشون معك أن يغسلوا أيديهم بكثرة. "

حافظ على نظافة أية جروح لديك وغير ضماداتها حسب

• التعليمات حتى تتدمل.

• تجنب مشاركة الآخرين في استخدام الأدوات الشخصية مثل

المناشف وموس الحلاقة.

• اغسل ملابسات سريرك وجفها على أعلى درجات الحرارة

الممكنة حسب التعليمات.

• أخبر مقدمي الرعاية الصحية إليك أنك مصاب بالعنقودية الذهبية المقاومة

للميثيسيلين. يشمل هؤلاء ممرضات الرعاية الصحية المنزلية والمساعدین

والمعالجين والموظفين في عيادات الأطباء.

• قد يقدم إليك طبيبك تعليمات أخرى.

إذا كانت لديك أية أسئلة، يرجى طرحها على الطبيب أو الممرضة.

